IV Fórum

Internacional Sobre Segurança do Paciente

Erros de Medicação

**Dia 17 e 18 de Agosto de 2012
MINASCENTRO - BELO HORIZONTE / MINAS GERAIS**

Erros de medicação em Atenção Primária

Denise Bueno

**Professora Associada do Departamento de Produção e Controle de Medicamentos- Faculdade de Farmácia – UFRGS
Programa de Pós Graduação em Assistência Farmacêutica-
Associação de Instituições de Ensino Superior**

Fatores Coletivos

Fatores individuais

Erros de Medicação

Gerenciamento

Dispensação

Administração

Prescrição

Circunstância de risco

Risco

Incidente sem dano

Incidente com dano

Não aconteceu o incidente, mas um evento com expressivo potencial para dano ao paciente

Incidente que não atingiu o paciente

Incidente que atingiu o paciente, mas não causou dano

Incidente que atingiu o paciente e causou dano

- 46% a 56% de todos os **erros de medicação** ocorrem na transição de cuidados.
- Mais de 60% dos pacientes admitidos em hospitais terão **pelo menos um incidente**, durante a sua admissão.
- 12 a 17% dos Eventos Adversos Relacionados a Medicamentos ocorrem após a alta hospitalar, mais da metade destes são **considerados evitáveis**.
- 6 a 12% dos eventos adversos a medicamentos resultam em **visitas a emergência** e 5% em **readmissões hospitalares**.

Barnstein et al, 2005;
Cornish et al, 2005
Schnipper et al, 2006

Sistema Único de Saúde

Porta de entrada do Sistema

Atenção Primária

TERRITÓRIO

PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA

ESF
REFERÊNCIA

HOSPITAIS
ATENÇÃO SECUNDÁRIA
OU TERCIÁRIA

Unidades de Saúde

CONTRA-REFERÊNCIA

HOSPITAL

Evolução da Atenção Primária em Saúde-Brasil

2001

2011

*ESF Implantadas

Porta de entrada do Sistema de Saúde- Busca de atendimento

Casos crônicos e agudos

Hospitais Privados

Hospitais Públicos

Medicamentos na APS

Setor Público

Farmácias

Dispensários de Medicamentos

Setor Privado

Drogarias e Farmácias

Não existe território previsto na área da Assistência Farmacêutica

Múltiplos problemas relacionados a medicamentos na APS

Pacientes que consultam em múltiplos locais

Dispensários possuem medicamentos que estão sem controle

Medicamentos que saem da Unidade de saúde vão para os domicílios

Medicamentos utilizados de forma inapropriada

Modelo voltado a Atenção Primária em Saúde

Metas Internacionais de Segurança do Paciente de APS

Avaliação de Dispensários de um Distrito de Saúde

- Foram avaliadas 24 Unidades de Saúde. Com e sem ESF.
- 33,33% medicamentos estocados fora dos dispensários.
- As unidades não possuíam qualquer tipo de controle de temperatura ou de incidência solar.

The screenshot shows a web browser window with the URL <http://www.aps.uff.br/index.php/aps/article/view/953/440>. The browser's search bar contains the text "revista atenção primária em saúde". The page content includes the following text:

ARTIGOS ORIGINAIS

**AVALIAÇÃO DOS DISPENSÁRIOS DO DISTRITO SANITÁRIO
GLÓRIA-CRUZEIRO-CRISTAL PORTO ALEGRE-RS**

Assessment of district health dispensaries in Gloria-Cruzeiro-Cristal Porto Alegre-RS

Denise Bueno¹, Adriana Rodrigues Machado²

RESUMO

O objetivo deste estudo foi descrever o funcionamento de dispensários de medicamentos em um distrito sanitário na cidade de Porto Alegre-RS-Brazil e refletir sobre o papel do farmacêutico na Atenção Primária à Saúde. A metodologia empregada foi um estudo transversal nas unidades de saúde com e sem equipes de Saúde da Família no período de julho

ABSTRACT

The objective of this study was to describe the operation of medicine dispensaries in a health district in the city of Porto Alegre-RS-Brazil, and to reflect on the pharmacist's role in Primary Health Care. The methodology employed was a cross-sectional study in health units, with and without Family Health teams, in the period from July to October

Medicamento nas Unidades de saúde

	US (n=10)	PSF (n=14)
Existência de um único responsável pelo dispensário	44,44	28,57
Existência de conferência física de medicamentos	100	100
Existência de descarte de medicamento	0	21,43
Devolução de Medicamentos a GMAT	88,89	92,85
Existência de recolhimento de Medicamentos vencidos	66,67	78,57

Área Física dos dispensários

	Dispensários		Sala dos injetáveis	
	US(10)	PSF(14)	US(10)	PSF(14)
Área física de m ²	5,67	4,07	6,78	7,21
Manutenção	66,67	78,57	77,78	85,71
Condições de higiene	77,78	50	88,89	85,71
Condições de iluminação	11,11	50	100	100
Condições de ventilação	44,44	42,86	66,67	100

- Existência de geladeiras para estocar as insulinas foi constatada em todas as unidades.
- Em 65% das unidades as geladeiras eram de uso exclusivo para medicamentos .
- O controle de temperatura era realizado em 22,22% dos refrigeradores.

Análise de Prescrições em Unidade Básica de Saúde

- Foram analisadas **3701** prescrições .
- **10189** medicamentos dispensados em Unidade Básica de Saúde.
- 20% das prescrições eram **eletrônicas**.
- **37,1%** das prescrições eletrônicas apresentaram **erro** na via de administração.

Resultados

Foram avaliadas 3701 prescrições

Procedência da prescrição

Procedência das prescrições que apresentaram erros

Total de erros encontrados por procedência da prescrição.

Número de dados ilegíveis por prescrição

<i>Dados Ilegíveis</i>	<i>Número de Prescrições</i>	<i>Porcentagem (%)</i>
Unidade	505	13,6
Posologia	94	2,5
Data	41	1,1
Concentração	27	0,7
Quantidade	3	0,08
Total	670	18,0

Erro de medicação - Administração

RDC 137/03 -Não é indicado para crianças abaixo de 14 anos, com exceção de casos de artrite juvenil crônica.

Fatores que contribuíram para o erro: desconhecimento dos riscos associados.

Abordagem focada no indivíduo - *Sintomática*

Neste caso o erro pode não ser relatado.

Identificação do erro

Erro humano

Punição da funcionária

Erro de medicação -Administração

Abordagem Sistêmica

Existe confiança na equipe para relatar o erro.

Fatores que contribuíram para o erro: utilização do nome comercial, distração, organização do processo de trabalho.

Ações multidisciplinares: elaboração de protocolos de prescrição, treinamentos das equipes, reconhecimento da legislação.

Modelo do queijo suíço aplicado ao erro de medicação

- O modelo do queijo Suíço é um modelo explicativo que permite compreender a multifatorialidade subjacente à ocorrência de falhas. *James Reason*

Diagrama de Ishikawa- Aplicado ao Erro de Medicação

Recomendações para diminuição de erros de medicação na APS

- Fortalecer a **autonomia** dos pacientes.
- Profissionais da saúde devem ter **maior escuta**.
- Favorecer o uso das **tecnologias da informação**.
- Promover elevado **grau de confiabilidade** dos serviços visando a melhoria da segurança da medicação.
- Implementar **Programa de Monitorização da Segurança dos Medicamentos**.
- Trabalhar a **qualidade dos medicamentos** que são disponibilizados na rede de atenção a saúde.
- Trabalhar a **rede de atenção em saúde**.

QUALIFAR-SUS

EIXO INFORMAÇÃO

Produzir documentos técnicos e disponibilizar informações que possibilitem o acompanhamento, monitoramento e avaliação das ações e serviços da Assistência Farmacêutica.

EIXO ESTRUTURA

Contribuir para a estruturação dos serviços farmacêuticos no SUS, de modo que estes sejam compatíveis com as atividades desenvolvidas na Assistência Farmacêutica, considerando a área física, os equipamentos, mobiliários e recursos humanos.

EIXO CUIDADO

Inserir a Assistência Farmacêutica nas práticas clínicas visando a resolatividade das ações em saúde, otimizando os benefícios e minimizando os riscos relacionados à farmacoterapia.

EIXO EDUCAÇÃO

Promoção da educação permanente e capacitação dos profissionais de saúde para qualificação das ações da Assistência Farmacêutica voltadas ao aprimoramento das práticas profissionais no contexto das redes de atenção à saúde.

Sistema Informatizado

Manual de Identidade Visual de Medicamentos

Referências

1. Organization WH. World Alliance for Patient Safety: forward programme 2005. World Health Organization; 2004.
2. Hiatt HH, Barnes BA, Brennan TA, Laird NM, Lawthers AG, Leape LL, et al. A study of medical injury and medical malpractice. *N Engl J Med.* 1989 Aug 17;321(7):480-4.
3. Avelar A, Salles C, Bohomol E, Feldman L, Peterlini M, Harada M, et al. 10 Passos para a Segurança do Paciente. São Paulo: Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo (COREN-SP) e Rede Brasileira de Enfermagem e Segurança do Paciente (REBRAENSP); 2010.
4. Barnsteiner JH. Medication reconciliation: transfer of medication information across settings-keeping it free from error. *J Infus Nurs.* 2005 Mar-Apr;28(2 Suppl):31-6.
5. Cornish PL, Knowles SR, Marchesano R, Tam V, Shadowitz S, Juurlink DN, et al. Unintended medication discrepancies at the time of hospital admission. *Arch Intern Med.* 2005 Feb 28;165(4):424-9.
6. Schnipper JL, Kirwin JL, Cotugno MC, Wahlstrom SA, Brown BA, Tarvin E, et al. Role of pharmacist counseling in preventing adverse drug events after hospitalization. *Arch Intern Med.* 2006 Mar 13;166(5):565-71.
7. Pippins JR, Gandhi TK, Hamann C, Ndumele CD, Labonville SA, Diedrichsen EK, et al. Classifying and predicting errors of inpatient medication reconciliation. *J Gen Intern Med.* 2008 Sep;23(9):1414-22.
8. Pharmacists ASoH-S. Medication Reconciliation Handbook. Oakbrook Terrace: Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations and 2006.
9. Gleason KM, McDaniel MR, Feinglass J, Baker DW, Lindquist L, Liss D, et al. Results of the Medications at Transitions and Clinical Handoffs (MATCH) study: an analysis of medication reconciliation errors and risk factors at hospital admission. *J Gen Intern Med.* 2010 May;25(5):441-7.
10. McGaw J, Conner DA, Delate TM, Chester EA, Barnes CA. A multidisciplinary approach to transition care: a patient safety innovation study. *Perm J.* 2007 Fall;11(4):4-9.
11. Karapinar-Carkit F, Borgsteede SD, Zoer J, Siegert C, van Tulder M, Egberts AC, et al. The effect of the COACH program (Continuity Of Appropriate pharmacotherapy, patient Counselling and information transfer in Healthcare) on readmission rates in a multicultural population of internal medicine patients. *BMC Health Serv Res.* 2010;10:39.