VI Fórum Internacional sobre Segurança do Paciente Erros de Medicação

3 e 4 agosto 2018
Belo Horizonte • MG

Realização

Correalização

Empresas parceiras

Apoio institucional

*OMS, 2017 – WHO Global
Patient Safety Challenge*

ERROS DE MEDICAÇÃO

- 1ª causa de dano evitável no mundo
 - US\$ 42 bi/ano
- maior em países em desenvolvimento

Cost of Prescription Drug–Related Morbidity and Mortality

Jonathan H. Watanabe, PharmD, MS, PhD¹ ,
Terry McInnis, MD, MPH², and Jan D. Hirsch, PhD¹

Annals of Pharmacotherapy
1–9
© The Author(s) 2018
Reprints and permissions:
sagepub.com/journalsPermissions.nav
DOI: 10.1177/1060028018765159
journals.sagepub.com/home/aop

Morbimortalidade associada ao uso de medicamentos:
US \$ 528.4 bilhões em 2016 (16% dos gastos com saúde nos EUA)

Regimes terapêuticos para um problema de saúde não otimizado
e/ou medicamento recentemente prescrito que causa dano à saúde:
Gastos > artrite, obesidade, câncer, diabetes e AVC (US\$ 230 bi)

PRIORIZANDO...

TRÊS CATEGORIAS DE AÇÕES PRIORITÁRIAS

PRIORIZANDO...

TRÊS CATEGORIAS DE AÇÕES PRIORITÁRIAS

PRIORIZANDO...

TRÊS CATEGORIAS DE AÇÕES PRIORITÁRIAS

4 medicamentos
ou mais

PRIORIZANDO...

TRÊS CATEGORIAS DE AÇÕES PRIORITÁRIAS

4 medicamentos
ou mais

Quanto mais medicamentos, maior o risco?

- Indicador fácil de ser coletado
- Frequentemente associado a ocorrência de danos ou utilização de farmacoterapia inadequada

Quanto mais medicamentos, maior o risco?

- Indicador fácil de ser coletado
- Frequentemente associado a ocorrência de danos ou utilização de farmacoterapia inadequada

Revista de Saúde Pública

Rev Saude Publica. 2017;51 Suppl 2:19s

Polypharmacy: a challenge for the primary health care of the Brazilian Unified Health System

Renata Cristina Rezende Macedo do Nascimento^I, Juliana Álvares^{II}, Augusto Afonso Guerra Junior^{III}, Isabel Cristina Gomes^{III}, Micheline Rosa Silveira^{II}, Ediná Alves Costa^{IV}, Silvana Nair Leite^V, Karen Sarmento Costa^{VI,VII,VIII}, Orlando Mario Soeiro^{IX}, Ione Aquemi Guibu^X, Margô Gomes de Oliveira Karnikowski^{XI}, Francisco de Assis Acurcio^{II}

PNAUM
9,4% dos usuários de medicamentos adultos → **polifarmácia** (≥5 medicamentos)

Quanto mais medicamentos, maior o risco?

6.048 prescrições
1.777 pacientes
Comunidade

May 2012

Investigating the prevalence and causes of prescribing errors in general practice:

The PRACTiCe Study

(PREvalence And Causes of prescribing errors in general practiCe)

A report for the GMC

The University of
Nottingham

UNITED KINGDOM · CHINA · MALAYSIA

General
Medical
Council

Quanto mais medicamentos, maior o risco?

6.048 prescrições
1.777 pacientes
Comunidade

30% usuários de ≥ 5 medicamentos
47% usuários de ≥ 10 medicamentos

Pelo menos um erro de prescrição ou monitoramento em um ano

Quanto mais medicamentos, maior o risco?

6.048 prescrições
1.777 pacientes
Comunidade

Número de medicamentos, sexo masculino, idade < 15 ou >64

Associação a erros de medicação

PRIORIZANDO...

TRÊS CATEGORIAS DE AÇÕES PRIORITÁRIAS

4 medicamentos
ou mais

PRIORIZANDO...

TRÊS CATEGORIAS DE AÇÕES PRIORITÁRIAS

PRIORIZANDO...

TRÊS CATEGORIAS DE AÇÕES PRIORITÁRIAS

Identificar prioridades em cenários e países

4 medicamentos ou mais

Pirâmide etária. Brasil, 2022

Pirâmide etária. Brasil, 2022

Pirâmide etária. Brasil, 2030

Pirâmide etária. Brasil, 2022

Pirâmide etária. Brasil, 2030

PRIORIZANDO...

TRÊS CATEGORIAS DE AÇÕES PRIORITÁRIAS

Identificar prioridades em cenários e países

4 medicamentos ou mais

PRIORIZANDO...

TRÊS CATEGORIAS DE AÇÕES PRIORITÁRIAS

IDADE + NÚMERO DE MEDICAMENTOS

- Indicadores de fácil coleta
- **Uso de múltiplos medicamentos:** frequentemente associados à ocorrência de danos ou uso de farmacoterapia inadequada

IDADE + NÚMERO DE MEDICAMENTOS

- Indicadores de fácil coleta
- **Uso de múltiplos medicamentos:** frequentemente associados à ocorrência de danos ou uso de farmacoterapia inadequada

idosos

pediatria?

EDITORIAL

JAMA

Pediatric Polypharmacy

Time to Lock the Medicine Cabinet?

BANCOS DE DADOS HOSPITALARES

- Exposição no **1º dia de hospitalização** 3 a 5 medicamentos
- **Dias subsequentes:** 3 a 9 medicamentos
- **Tipo de hospital** (pediátrico ou não) não influenciou
- **↑ exposição:** idade do paciente e tempo de hospitalização
- **Grande variabilidade na exposição a medicamentos...**

Onde está o consenso quanto à prescrição em pediatria?
Too much OR to little?

EDITORIAL

JAMA

Pediatric Polypharmacy

Time to Lock the Medicine Cabinet?

VERIFICAR OS EXTREMOS DE USO NA PEDIATRIA

Superexposição X Subexposição

Aprimoramento de protocolos de indicação e desprescrição

Onde está o consenso quanto à prescrição em pediatria?

Too much OR to little?

EDITORIAL

JAMA

Pediatric Polypharmacy

Time to Lock the Medicine Cabinet?

NA COMUNIDADE:
Uso de múltiplos medicamentos por longos períodos

Off-label do Off-label...

Journal of Child and Adolescent Psychiatric Nursing

Use of Polypharmacy With Children and Adolescents

Journal of Child and Adolescent Psychiatric Nursing **26** (2013) 158–159
© 2013 Wiley Periodicals, Inc.

Journal of Child and Adolescent Psychiatric Nursing

Use of Polypharmacy With Children and Adolescents

Journal of Child and Adolescent Psychiatric Nursing **26** (2013) 158–159
© 2013 Wiley Periodicals, Inc.

Journal of Child and Adolescent Psychopharmacology, Vol. 24, No. 5 | Original Articles

Period Prevalence of Concomitant Psychotropic Medication Usage Among Children and Adolescents with Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder During 2009

Keith A. Betts Vanja Sikirica, Paul Hodgkins, Zhou Zhou, Jipan Xie, Anthony DeLeon, M. Haim Erder, and Eric Q. Wu

> 71.200 crianças e 49.900 adolescentes

12,6% de crianças com diagnóstico de apenas TDAH recebem mais de um psicoestimulante → 41,7% com outro diagnóstico recebem um agente adicional → Se transtorno opositivo-desafiador + um agente

Prescription of Psychiatric Medications and Polypharmacy in the LAMS Cohort

Robert A. Kowatch, M.D., Ph.D.
Eric A. Youngstrom, Ph.D.
Sarah Horwitz, Ph.D.
Christine Demeter, M.A.
Mary A. Fristad, Ph.D., A.B.P.P.
Boris Birmaher, M.D.
David Axelson, M.D.

Neal Ryan, M.D.
Thomas W. Frazier, Ph.D.
L. Eugene Arnold, M.D.
Andrea S. Young, Ph.D.
MaryKay Gill, R.N., M.S.N.
Robert L. Findling, M.D., M.B.A.

Predictors of Polypharmacy and Off-Label Prescribing of Psychotropic Medications: A National Survey of Child and Adolescent Psychiatrists

MARCIA A. KEARNS, MEd, MA
KRISTIN M. HAWLEY, PhD

Diferentes fatores associados: idade (mais velho), sexo (masculino), cor de pele (branco ou não-branco), comorbidades, tipo de diagnóstico, perfil do psiquiatra...

Estimativas de polifarmácia nos EUA > 52%

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK262747/>

PROGRAMME GRANTS FOR APPLIED RESEARCH

VOLUME 2 ISSUE 3 JUNE 2014
ISSN 2050-4322

ADRIC: Adverse Drug Reactions In Children – a programme of research using mixed methods

*Rosalind L Smyth, Matthew Peak, Mark A Turner, Anthony J Nunn,
Paula R Williamson, Bridget Young, Janine Arnott, Jennifer R Bellis,
Kim A Bird, Louise E Bracken, Elizabeth J Conroy, Lynne Cresswell,
Jennifer C Duncan, Ruairi M Gallagher, Elizabeth Gargon,
Hannah Hesselgreaves, Jamie J Kirkham, Helena Mannix,
Rebecca MD Smyth, Signe Thiesen and Munir Pirmohamed*

DOI 10.3310/pgfar02030

NHS
National Institute for
Health Research

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK262747/>

PROGRAMME GRANTS FOR APPLIED RESEARCH

VOLUME 2 ISSUE 3 JUNE 2014
ISSN 2050-4322

**ADRIC: Adverse Drug Reactions In Children –
a programme of research using mixed methods**

- 5.118 crianças → 3% de evento adverso na admissão (22% evitável)
→ 16% de evento adverso durante internação
- *Usos off-label*: ↑risco de evento adverso em 67% na admissão e 95% na internação
 - Opioides e medicamentos para anestesia geral > 50% dos eventos adversos
- Cada medicamento adicionado à farmacoterapia: ↑risco em 20-25%
 - Cada medicamento off-label: ↑risco em 30%

Pediatric Critical Care Medicine : a Journal of the Society of Critical Care Medicine and the World Federation of Pediatric Intensive and Critical Care Societies. 17(5):e218-28, MAY 2016

Epidemiology of Polypharmacy and Potential Drug-Drug Interactions Among Pediatric Patients in ICUs of U.S. Children's Hospitals.

Dingwei Dai; James A Feinstein; Wynne Morrison; Athena F Zuppa; Chris Feudtner

- Média de medicamentos utilizados em UTI pediátrica ~ 10
- Média de medicamentos utilizados durante hospitalização ~ 20

Epidemiology and potential associated risk factors of drug-related problems in hospitalised children in the United Kingdom and Saudi Arabia

Asia N. Rashed • Antje Neubert • Stephen Tomlin • John Jackman • Hani Alhamdan • Adnan AlShaikh • Ahmed Attar • Mohammed Aseeri • Lynda Wilton • Ian C. K. Wong

BJCP British Journal of Clinical Pharmacology

Epidemiology and potential risk factors of drug-related problems in Hong Kong paediatric wards

Asia N. Rashed,^{1,2} Lynda Wilton,¹ Charles C. H. Lo,³ Benjamin Y. S. Kwong,³ Suzanne Leung³ & Ian C. K. Wong^{1,4}

• UTI pediátrica ou neonatal → Maior incidência de eventos adversos

IDADE + NÚMERO DE MEDICAMENTOS

IDADE + NÚMERO DE MEDICAMENTOS

Revista de
Saúde Pública

Rev Saude Publica. 2017;51 Suppl 2:19s

Polypharmacy: a challenge for the primary health care of the Brazilian Unified Health System

Renata Cristina Rezende Macedo do Nascimento^I, Juliana Álvares^{II}, Augusto Afonso Guerra Junior^{III}, Isabel Cristina Gomes^{IV}, Micheline Rosa Silveira^V, Ediná Alves Costa^{VI}, Silvana Nair Leite^{VII}, Karen Sarmiento Costa^{VIII}, Orlando Mario Soeiro^{IX}, Ione Aquemi Guibu^X, Margô Gomes de Oliveira Karnikowski^{XI}, Francisco de Assis Acurcio^{II}

PNAUM
18,1% dos usuários de medicamentos idosos → polifarmácia (≥5 medicamentos)

Desfechos negativos

- Aumento na mortalidade
- Quedas
- Reações adversas a medicamentos
- Erros de medicação
- Aumento no tempo de internação
- Readmissão logo após alta
- Uso de medicamentos potencialmente inadequados para idosos
- **Maior número de medicamentos → maior o risco de danos**

MASNOON et al. BMC Geriatr. 2017;17(1); MOLOKHIA et al. BMC Fam Pract. 2017;18(1); NASCIMENTO et al., Lat Am J Pharm. 2016;35(4). MAHER et al. Expert Opin Drug Saf. 2014;13(1); RETAMAL et al. Farm Hosp. 2014;38(4); AVERY et al. PRACtICe study. General Medical Council [Online]. 2012; GUTHRIE et al. Brit Med. 2011;342:d3514;); BOURGEOIS et al. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2010;19(9)

ONDER et al., Arch Intern Med. 2010;170:1142-8

GerontoNet – *score* de risco para RAM em idosos

Critério de risco para RAM	Pontos
4 ou mais comorbidades	1
Insuficiência cardíaca	1
Disfunção hepática (>2x limite superior)	1
<5 medicamentos	0
5-7 medicamentos	1
≥8 medicamentos	4
RAM prévio	2
Disfunção renal (Clearance de creatinina < 40 ml/min)	1

≥4 → alto risco para efeito adverso

TAGIISURAN et al., PLOS One. 2014;41:771-6.

Brighton Adverse Drug Reaction Risk (BADRI) score

Critério de risco para RAM	Pontos
Hiperlipidemia	1
≥8 medicamentos	1
Estadia hospitalar ≥ 12 dias	1
Uso de agentes para tratamento do diabetes	1
Leucocitose na admissão	1

Quanto maior o score, maior o risco de efeito adverso

MAS O QUE FAZER COM ISSO?

TRÊS CATEGORIAS DE AÇÕES PRIORITÁRIAS

MAS O QUE FAZER COM ISSO?

Critério de inclusão para serviços e atividades que promovam o uso seguro de medicamentos!

MAS O QUE FAZER COM ISSO?

Critério de inclusão para serviços e atividades que promovam o uso seguro de medicamentos!

Prioridades - Medicamentos

**ESTRATÉGIAS
COLETIVAS
FOCADAS NO
PRODUTO**

**CUIDADO
INDIVIDUAL E
CONTÍNUO
FOCADO NO
PACIENTE**

Atividades básicas para o cuidado do paciente para todas as disciplinas do cuidado:

- ✓ **Planejar** e assistir **cada paciente**;
- ✓ **Monitorar** o paciente quanto aos resultados do cuidado;
- ✓ **Modificar** o cuidado quando necessário;
- ✓ **Complementar** o cuidado;
- ✓ Planejar o **acompanhamento**.

Atividades básicas para o cuidado do paciente para todas as disciplinas do cuidado:

- ✓ **Planejar** e assistir **cada paciente**;
- ✓ **Monitorar** o paciente quanto aos resultados do cuidado;
- ✓ **Modificar** o cuidado quando necessário;
- ✓ **Complementar** o cuidado;
- ✓ Planejar o **acompanhamento**.

JCI, 2011

➔ **O cuidado é um processo contínuo, individual e sistemático...**

**O MELHOR CUIDADO POSSÍVEL PARA AQUELE
PACIENTE EXPOSTO AO MAIOR RISCO!**

USO SEGURO DE MEDICAMENTOS EM PACIENTES PEDIÁTRICOS

ISSN: 2317-2512 | VOLUME 6 | NÚMERO 4 | NOVEMBRO 2017

BOLETIM ismp
Brasil
Instituto para Práticas Seguras no Uso de Medicamentos

MEDICAMENTOS POTENCIALMENTE INADEQUADOS PARA IDOSOS

ISSN: 2317-2512 | VOLUME 6 | NÚMERO 6 | AGOSTO 2017

BOLETIM ismp
Brasil
Instituto para Práticas Seguras no Uso de Medicamentos

MEDICAMENTOS POTENCIALMENTE PERIGOSOS: LISTA DOS MEDICAMENTOS PARA INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANÊNCIA

ISSN: 2317-2512 | VOLUME 5 | NÚMERO 5 | AGOSTO 2016

BOLETIM ismp
Brasil
Instituto para Práticas Seguras no Uso de Medicamentos

Realização

Instituto para Práticas Seguras no Uso de Medicamentos

Correalização

ANVISA
Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Ministério da Saúde

Governo Federal

Empresas parceiras

Apoio institucional

VI Fórum Internacional
sobre Segurança do Paciente
Erros de Medicação

3 e 4 agosto 2018
Belo Horizonte • MG

MUITO OBRIGADO!